



Nota MdS 2859-2014 - Piano sorveglianza IA.pdf

direzione.dpv, dip.veterinaria,
prevenzione.veterinaria, dipprevvet,
dipartimento.veterinario,
dipartimento.prevveterinaria,
veterinario.segreteria.dipartimento,
dipartimentoveterinario,
comunicazidipveterinario,
dipartimento.veterinario, massimo_aguzzi,
veterinario.sondrio, dip.veterinario,
per: dipveterinaria, perego.diego, arubini,
silvestro.abrami, sanita.animale,
areasanitaanimale, sanita.animale,
ServiziVeterinari, veterinario.sondrio,
magrinim, gelsomino.giuseppe,
dipartimento.veterinario, etesta,
dipprevvet, claudio.bovera,
enrico.angelo.moraschina, felice_novazzi,
perego.diego, vincenzo.traldi, l.turetti,
saan

Marco Farioli

per:

03/03/2014 16:32

Piero Frazzi, Laura Gemma Brenzoni, mariagrazia.zanoni,
Cc: dominga.avisani, mario.chiari, loredana.marella@izsler.it,
mariagrazia.guerini, Matteo Ferrara

Si trasmette in allegato il Piano Nazionale di sorveglianza IA 2014.

Rispetto al Piano dello scorso anno non è cambiato sostanzialmente nulla; per questo motivo l'attuazione da parte di codesti DPV di quanto previsto dal DDUO 3009/2011 assolve agli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione nazionale.

Ciò premesso da una verifica della attività svolta nel 2013, rispetto alle disposizioni vigenti, è opportuno che :

- rispetto alle tipologie di allevamento avicolo, di seguito elencate, siano effettuate verifiche al fine di aggiornare puntualmente la BDR/BDN in quanto il numero di allevamenti testati, per ciascuna di queste tipologie non è coerente con il controllabile desunto da BDR/BDN

| |
|---------------------------------------|
| Ratiti |
| Faraone |
| Selvaggina (Fagiani, Pernici, Starne) |
| Quaglie riproduttori |
| Anatre + Oche |

- rispetto agli allevamenti di anatre e oche siano effettuati oltre che i prelievi di sangue per gli esami sierologici, **anche i tamponi o poll di feci per esami virologici**
- rispetto agli allevamenti di ratidi siano effettuati oltre che i tamponi o poll di feci per esami virologici **anche i prelievi di sangue per gli esami sierologici**,
- rispetto agli allevamenti di quaglie riproduttori, diversamente da quanto indicato nel DDUO 3009/2011 **è necessario effettuare tamponi cloacali per esame virologico**

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Marco Farioli



- Nota MdS 2859-2014 - Piano sorveglianza IA.pdf